

表1 内臓感覚表現尺度

Tab.1 Expression scale of visceral sensation

[I]items of volume and weight subscale	[II]items of movement subscale
お腹に何かある お腹が膨れた 胃がズッシリした お腹がポッコリした 胃にたまっている 胃が大きくなった お腹がドーンとした お腹がはる 胃が重たい 胃がパンパンした お腹が苦しい 胃が圧迫した	胃がキュルキュルした 胃が縮んだ お腹がグルグルした 胃が締めつけられた 胃がギュツとした
Items score 'I don' t feel it at all' =1, 'I feel it very much' =4	
minimum score 12	minimum score 5
maximum score 48	maximum score 20

表 2 内臓感覚表現尺度得点と快-不快得点の相関係数


Tab.2 Coefficient of correlation with expression scale of visceral sensation score and the pleasant- unpleasantness score

visceral sensation score		pleasant-unpleasantness score
volume and weight score	baseline(water)	-0.79**
	hight	-0.22
	low	-0.61*
movement score	baseline(water)	-0.47
	hight	-0.13
	low	-0.19

** : p<0.01, * : p<0.05

a. 容量・重量因子

得点



b. 運動因子

得点

○—水
△—報酬(高)
×—報酬(低)




図1 内臓感覚表現尺度の下位尺度における3つの試験食による摂取前後の得点(平均得点±標準偏差) (a)容量・重量因子, (b)運動因子

Fig.1 Change of scores in two scales for evaluation of expression scale of visceral sensation.

These figures show changes of score by three test foods (mean±SD). (a)volume and weight score, (b)movement score.




図2 試験食による快—不快得点 (平均値±標準偏差)
 Fig.2 Change of scores in the evaluation of pleasant—unpleasantness by three test foods (mean±SD).